ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Premiere Observation

Un soldat ivre tombat sur un escalier, il se fit une playe sur l'os coronal du costé gauche en sa partie superieure d'un travers de poulce de longueur et penetrant jusqu'au pericrane; le Chirurgien qui fut appellé pour le panser ne pouvant arrester le sang tampona la playe de bourdonnets couverts de poudre astringente, on l'amena a l'hopital trois jours après, nous trouvames les bords de cette playe eloignés l'un de l'autre par la charpy, la poudre et le sang qui avoit fait une espece de mastich, nous otames tout ce qui pouvoit empescher la reunion de la playe, nous la pansames plattement, l'hemorragie recommencea, on comprimat la playe, on saignat le malade plusieurs fois, on le clisterisat et on le mit a une severe diette, l'hemorragie revenoit de tems en tems, il tomboit en

ARC 44 n°19

foiblesse, il avoit la face œdemateuse et elle etoit souvent agitée de mouvemens convulsifs; nous soupçonames une fracture au Crane et un épanchement sur le cerveau, et en consequence le trepan fut determiné. nous fimes donc l'incision cruciale onze jours aprés sa chute, on le pansat methodiquement, et dez ce moment l'hemorragie et les mouvemens convulsifs cesserent, la suppuration se fit, et le malade guerit sans le trepan, qui auroit été fort inutil.

Je trouve dans cette courte observation deux Circonstances, dont le dénouëment passe la science du commun des gens de l'art. 1° pourquoy la face etoit elle devenüe œdemateuse, et etoit elle agitée de mouvemens convulsifs.

2° pourquoy ne pouvoit on pas arrester l'hemorragie d'une petite playe, et qu'elle cessat dez qu'on l'eut dilatée, la dilatation n'etant necessaire ny pour faire la suture ny pour comprimer d'avantage.

la reponse a la 1re demande se tire de hequet Commentateur d'hippocrate sur l'aphorisme 12 de la 7e section.

Membranacei generis in universo corpore communitates loquitur tota animalis aeconomia, teste illa meningum cerebri cum oculorum adnatâ responsione in cerebri vulneribus; quam enim tunc concepêre meninges inflammationem, ophtalmia representat: significante iterum illa pericranii cum caeteris faciei et capitis externi partibus affinitate, quae ea est, ut phlogosi particâ tensum convulsumve alicubi pericranium in tumorem elevet omnes faciei partes.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

la resolution de la 2e question se trouve dans Boerhaave aphor. 159 et 160. si arteria non nimis magna nec cordi admodum propinqua omninò transversim dissecatur, retrosiliens atque inter solida vicina se recondens, sibimet obthuraculo est. si eadem vulneratur transversim non tota dissecta, retrotractis fibris vulnus ampliatur, hinc hemorragia perpetua.

Seconde observation

Un jeune homme agé de 26 ans d'un village eloigné de cette ville d'une lieu et demie tombat de dessus un arbre, on le crut assommé, il se fit beaucoup de mal au dos et se cassa le bras droit avec playe, on le mit sur un chariot et on l'amenat a notre hopital. J'examinay soigneusement les vertebres du dos et des lombes, je n'y trouvay rien de derangé, il remuoit bien les jambes, il avoit mesme fait quelques pas depuis sa chute, ainsi je me tranquillisay de ce costé là.

Quant au bras, je trouvay que c'etoit l'os du cubitus qui etoit disloqué d'avec les os du carpe, et qui sortoit par une playe de trois travers de doigt de longueur, qu'il avoit fait transversalement en se luxant. La reduction de l'os se fit assés aisément, mais comment le contenir en sa place, puisque les teguments etoient dechirés. J'avisay, pendant que

deux hommes tenoient le bras dans sa situation naturelle et l'os réduit, de faire faire quatre points d'équille pour rejoindre les chairs et contenir; Cette operation reussit, on le saignat, et j'en augurois bien, lorsque quatre jours après il luy survint des mouvemens convulsifs, des craquemens de dents, de violentes douleurs dans le dos, un gonflement dans le bras malade, petitesse dans l'autre pouls, sueur abondante et quelquefois froide, qui le firent perir au bout de seize heures.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Sa mort, mais plus encor les accidents qui la precederent, me surprirent, et je crus que quoique les vertebres ne fussent point luxées la secousse de la chute avoit pû causer une inflammation a la moelle de l'epine, et dela les symptomes, que le patient avoit éprouvé. mais cette inflammation est elle possible? mes reflexions et mon etude journaliere m'ont bientost fait abandonner cette

Cause en me découvrant la veritable sans cependant
me rendre plus sçavant pour un accident pareil, s'il —
se presentoit.

Je trouve dans Hippocrate page 828 de articulis. —
at vero quibus tibiæ ossa luxata, accedente vulnere
commissurâ quæ est ad pedem penitùs eminent, ea sive
intrò sive extra vergant minimè reponenda sunt,
sed sinenda, ut qui velit, ea reponat medicus. id enim
manifestò nosse oportet, eos, quibus ista reposita —
permanserint, interituros paucisque diebus duraturos,
convulsione namque sublati, pauci diem septimum superant.
page 829 eadem quoque ratio est, ubi cubiti ossa ad —
manûs articulum facto vulnere vel interiorem in partem
vel exteriorem emineant. certò enim tenendum est, cum —
cui recondita ossa permanserint, supraposito mortis —
genere intra paucos dies interiturum. quibus verò neque
reposita sunt, neque repositio tentata, eos multò plures

superesse. page 830. quod si recondito articulo convulsio accedat, is protinus expellendus est, et calidâ subindè — perfundendus &c.

Celse pense de mesme, Car après avoir indiqué la façon de remedier a tous les membres luxés, il dit dans le 8e livre Chap. 24. hæc facienda sunt in his casibus ubi sine vulnere ossa exciderunt. hic enim ingens periculum est, et eò gravius quò majus membrum est, quove — validioribus nervis aut musculis continetur. ideoque — humeris femoribusque metus mortis est, ac si reposita — ossa sunt, spes nulla est. non repositis tamen, nonnullum periculum est.

Scultet dans son arcenal de Chirurgie table 29 pag. 87 l'explique dans le mesme gout. si l'article est luxé, — ensorte qu'il soit ou découvert ou poussé quelque peu hors de la peau, la maladie est mortelle, et d'un plus grand — danger s'il est reduit que s'il ne l'est pas. Car s'il est

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

reduit, il cause un plus grand peril de convulsion, de gangrene et de mort. et a la page suivante. si après que l'os est reduit la convulsion survient, il faut aussitost le disloquer de nouveau en l'arrosant long tems &c.

suivant ces autheurs la luxation avec playe est une maladie dangereuse qui estropie nécessairement le sujet et souvent le fait mourir, et auquel on ne peut presque prester secours: Cependant la motte dans son traité de Chirurgie tome 4 page 428 et suivans, nous donne deux observations du tibia disloqué d'avec le pied avec playe, quil a guéri par la réduction et le pansement ordinaire.

Rouvenot fils